



BIOESTIMULANTE

# Packhard®



Bioestimulante Líquido

**Análisis Garantizado**

**% p/v**

|   |       |
|---|-------|
| Calcio (CaO) .....                          | 14.55 |
| Boro (B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) ..... | 1.04  |
| Carbono Orgánico Oxidable Total .....       | 6.5   |

**Fecha de Caducidad:** 3 años a partir de su formulación.

Contenido:

No. Lote

Fecha  
Formulación



Distribuido por:



A Company of Sumitomo Corporation

SUMMIT - AGRO CHILE SpA  
Orinoco 90, Oficina 2002,  
Las Condes - Santiago  
Tel. (56 2) 24306300  
[www.summit-agro.cl](http://www.summit-agro.cl)

Fabricado por:



Productos Químicos de Chihuahua SA de CV  
Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615  
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México CP. 31375  
Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770  
[www.innovakglobal.com](http://www.innovakglobal.com)

ETIQUETA DE DIVULGACIÓN  
SUMMIT AGRO

## “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón, mascarilla para polvos, lentes industriales, guantes y botas de hule. Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

### “PRIMEROS AUXILIOS”

**En caso de ingestión accidental:** Enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio).

**En caso de contacto cutáneo:** Quítese toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en abundancia. Lave el área afectada con agua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

**En caso de contacto ocular con el producto:** Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

### “MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPECTE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPECTE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“RESPECTE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

**GARANTÍA:** Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.

| Metales Pesados | Menor a: (ppm) |
|-----------------|----------------|
| Arsénico (As)   | 2.0            |
| Cadmio (Cd)     | 2.5            |
| Mercurio (Hg)   | 4.0            |
| Plomo (Pb)      | 3.3            |

## INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

**Packhard®** es una formulación a base de extractos concentrados de cascarillas agrícolas **ECCA Carboxy®**, que incorpora en su formulación Calcio y Boro, colaborando a producir frutos de alto valor económico por sus características organolépticas (firmeza, color, sabor, brillo) al ser asperjados antes de floración, promueve uniformidad de los tejidos florales y posterior cuaja.

Además, mitiga la incidencia de palo negro, mejora la síntesis de la cera en la cáscara de la fruta y tejidos foliares, optimiza el ingreso de Calcio y Boro en la pared celular del fruto mejorando la calidad, consistencia de la fruta y potencial de almacenamiento poscosecha de la fruta. Para un mejor resultado de la aplicación de **Packhard®** se recomienda utilizar junto a **Proquate Mg®**.

Al ser mezclado con **Proquate Mg®** y **Carboxy K®**, corrige la fiebre de primavera y/o toxicidad de Nitrógeno-amoniacal (acumulación de putrescina).

### USO:

En general todas las aplicaciones de **Packhard®** deberán efectuarse durante la etapa de llenado de fruto, asperjándolo desde cuajado hasta la maduración, pudiéndose seguir las siguientes indicaciones específicas.

Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el estanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

### DOSIS:

| Cultivo                     | Dosis (L/ha) | N° de aplicaciones | Concentración (cc/100 L de agua) | Momento de aplicación  |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Vides de mesa               | 2            | 2 - 3              | 200                              | * Post cuaja.<br>* Pre pinta.<br>* Inicio de pinta (10 - 20 %).  |
| Vides para vino             | 2            | 2 - 3              | 200                              | * 10 días antes de floración a inicio de floración<br>* Post cuaja.<br>* Pinta (10 - 20 %).                            |
| Manzanos*,<br>Perales.      | 2            | 2 - 3              | 200                              | * Post cuaja.<br>* 20 días después de cuaja.<br>* Pleno crecimiento de fruto.  |
| Carozos                     | 2            | 2 - 3              | 200                              | * Botón floral.<br>* 10 días después de cuaja.<br>* Fin de etapa 1 de crecimiento de fruto (endurecimiento de carozo). |
| Frutales de nuez            | 1            | 1 - 2              | 100                              | * Calda de amentos.<br>* 20 días después de cuaja.   |
| Cítricos                    | 1            | 2 - 3              | 100                              | * Botones florales separados.<br>* Dos aplicaciones durante la etapa de crecimiento activo del fruto.                  |
| Paltos                      | 2            | 2                  | 200                              | * Post cuaja.<br>* Fruto recién cuajado.   |
| Kiwi                        | 2            | 2 - 3              | 200                              | * Post cuaja.<br>* Inicio crecimiento de fruto.<br>* 60 días antes de cosecha.   |
| Olivo                       | 2            | 1 - 2              | 200                              | * Fruto cuajado.<br>* Inicio crecimiento de fruto.   |
| Berries                     | 2            | 2                  | 200                              | * Fruto cuajado.<br>* Inicio crecimiento de fruto.   |
| Tomate**<br>Ají<br>Pimiento | 2            | 1 - 2              | 300                              | * Fruto cuajado.<br>* Inicio crecimiento de fruto.   |
| Cucurbitáceas               | 1 - 3        | 1 - 2              | 200                              | * Fruto cuajado.<br>* Inicio crecimiento de fruto.   |
| Brásicas                    | 1 - 3        | 1 - 2              | 200                              | * Inicio de desarrollo del pan floral.<br>* Pleno desarrollo del pan floral.   |
| Cebollas,<br>Ajos           | 1 - 3        | 1 - 2              | 200                              | * Inicio de desarrollo de bulbo.<br>* Desarrollo de bulbo.   |

\* Para el caso de variedades de manzanas sensibles a bitter pit se debe considerar aumentar la dosis a 4 L/ha.

\*\* Para variedades de tomates susceptibles a podredumbre apical o Blossom end rot se debe considerar aumentar la dosis a 4 L/ha.

### COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos o carbonatos; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro departamento Técnico.

ATENCIÓN A CLIENTES



+52 614 4 36 00 66

# Packhard®

BIOESTIMULANTE